

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BUR-706

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, NEVE ÉS CÍME, A KÉPVISELŐ NEVE TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Merial 29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország. Képviselő: Rhone Vet Kft.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Merial Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation 69800 Saint Priest, Franciaország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
BUR-706 vakcina A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

A vakcina minden adagja tartalmaz:

Attenuált Fertőző bursitis vírus, S706 törzs, legalább.....10⁰ CCID₅₀

Segédanyagok, q.s.1 adag

4. TERÁPIÁS JAVALLAT(OK)

Csirkék immunizálása fertőző bursitis (gumboroi betegség) ellen.

5. ELLENJAVALLATOK

Nincsenek.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nincsenek.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Csirke.

8. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT, ALKALMAZÁS HELYE ÉS MÓDJA

A fagyasztva szárított vakcinát antisepticum- és fertőtlenítőszer mentes ivóvízben (1 ml/1000 adagos ampulla) kell feloldani. A feloldás után közvetlenül fel kell használni.

Egyedenkénti vakcinázás (1 napos életkortól)

Szembecseppentés (1000 adag példáján)

A feloldott vakcinát (1 ml) a cseppentőtől függően 40-60 ml antisepticum- és fertőtlenítőszer mentes ivóvízben kell tovább hígítani. Minden csibe szemébe egy cseppet kell juttatni, megvárni, amíg a csepp szétterjed, majd a csibe elengedhető.

Csőr bemártás (1000 adag példáján)

A feloldott vakcinát (1 ml) 250 ml antisepticum- és fertőtlenítőszer mentes ivóvízben kell tovább hígítani. A csőrt az ornyílásokig az így készített oldatba kell mártani, hogy a vakcina az orrjáratokba szivárogjon.

Tömegimmunizálás

spray (1 napos életkortól - 1000 adag példáján)

A feloldott vakcinát (1 ml) 300 ml (1-15 napos életkor) vagy 500 ml (21 napos életkortól) antisepticum- és fertőtlenítőszer mentes ivóvízben kell tovább hígítani. Ezt a mennyiséget kell a permetezőkészülék típusának megfelelően esetleg tovább hígítani. A mikrocseppeket előállítani képes készülékkel a vakcinát a madarak fölé kell permetezni. A megfelelő vakcinaeloszlás érdekében biztosítani kell, hogy a csirkék szorosan egymás mellé legyenek zárva a permetezés alatt.

Ivóvízben (5 napos életkortól - 1000 adag példáján)

Ampullánként kb. 1 ml ivóvízben feloldott vakcinát annyi ivóvízben kell továbbhígítani, amelyet a madarak egy-két órán belül biztosan elfogyasztanak. Az állományt az immunizálás előtt kb. 2 órán keresztül szomjaztatni kell.

9. HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁS, ha szükséges

Vakcinázási program:

A vakcinázási programot a helyi járványtani körülmények (a helyi vírustörzsek patogenitása, fertőtlenítési lehetőségek, a passzív eredetű immunitás mértéke), valamint az állomány jellege (húscsirke, tojójerce) alapján kell kialakítani.

Mivel az S 706 törzs egy napos életkortól adható, a következő programok egyike alkalmazható:

Húscsirkék:

A szubklinikai formát okozó vírussal fertőzött területen:

 alapimmunizálás: 1 napos életkorban

 emlékeztető immunizálás: 14 napos életkorban

A heveny formát okozó virulens vírussal fertőzött területen

 alapimmunizálás: 1 napos életkorban

 emlékeztető immunizálás: 11 és 21 napos életkorban



Tojójércék:

A szubklinikai formát okozó vírussal fertőzött területen
immunizálás 28 napos életkorban

A heveny formát okozó virulens vírussal fertőzött területen
alapimmunizálás: 1 napos életkorban
emlékeztető immunizálás: 14 és 28 napos életkorban

Bizonyos körülmények között a jobb védelem érdekében a vakcinázási programban az 1. napon adott BUR 706 immunizálás után a fertőző bursitis elleni inaktivált oltást is be kell építeni.

10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől elzárva tartandó!

+2 °C és +8 °C között, fénytől védve tárolandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Csak egészséges állatok vakcinázhatók.

Az általános higiéniai követelményeket be kell tartani.

A vakcina oldat előkészítéséhez csak steril antisepticum- és fertőtlenítőszer mentes eszközöket lehet használni.

Kidobás előtt a fel nem használt vakcinát és az üres ampullákat fertőtleníteni kell.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY ÉS A KÉSZÍTMÉNYBŐL KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. LEJÁRATI IDŐ

18 hónap Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

15. RENDELHETŐSÉG, FORGALMAZHATÓSÁG

Vényköteles.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez: Rhone Vet Kft. 2053 Herceghalom, Petőfi u. 9.

16. KISZERELÉSI EGYSÉGEK, és ha a forgalomba hozatali engedélybe fel van tüntetve, BONTATHATÓSÁG

1000, 10x1000, 5000, 10x5000, 15000, 10x15000, 20000, 10x20000 adag.

17. TÖRZSKÖNYVI SZÁM

2241/1/07 MgSzH-ÁTI (1000 adag)

2241/2/07 MgSzH-ÁTI (5000 adag)

2241/3/07 MgSzH-ÁTI (15.000 adag)

2241/4/07 MgSzH-ÁTI (20.000 adag)

18. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2007. augusztus 17.

