

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Dindoral SPF vakcina

## 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

MERIAL (29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes (Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, Franciaország)

## 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Dindoral SPF vakcina A.U.V.

## 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

A vakcina adagonként tartalmaz:

### Hatóanyag:

Pulyka vérzéses bélgyulladás vírusa (Domermuth törzs)  $\geq 9$  E.U\*

### Segédanyag(ok):

Sovány tejpor  $\leq 150$   $\mu$ g

Nátrium-glutamát  $\leq 22$   $\mu$ g

(\*E.U: ELISA Unit: az oltott 10 csirkéből legalább 9 szeropozitív válik a végtermék hatékonysági vizsgálatban)

## 4. JAVALLAT(OK)

Broiler pulykák vakcinázása adenovírus okozta vérzéses bélgyulladás (pulyka haemorrhagiás enteritis) ellen.

## 5. ELLENJAVALLATOK

Tenyészállatok és leendő tenyészállatok nem vakcinázhatók. A vakcina vírus kontakt úton terjed, ezért meg kell akadályozni a tenyész- és tojóállományokba való bekerülését.

Gyöngytyúk csibék nem vakcinázhatók.

## 6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismert. Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

## 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Pulyka

## 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Itatásos vakcinázás. Egyszeri immunizálás négyhetes életkorban ivóvízben itatva.

## 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A vakcinát úgy tesszük felhasználhatóvá, hogy egy ivóvízzel teli fecskendő tűjét az üveg gumidugóján keresztül átszúrjuk, a vizet befecskendezzük, majd a teljesen reszuszpendált oltóanyagot felszívjuk a fecskendőbe. Ezt követően a vakcinázáshoz használt ivóvíztartályba kiürítjük az oltóanyagot. A vakcina üvegét kétszer öblítjük ki, hogy az oltóanyagot teljes mértékben visszanyerjük. A vakcina-oldatot közvetlenül felhasználás előtt kell elkészíteni. Feloldás után a vakcina-oldatot tovább kell hígítani az állatok életkorának megfelelő mennyiségű klór- és antiszeptikum-mentes ivóvízben. 1000 állat részére az 1000 adagnak megfelelő fagyaszttva szárított oltóanyag-pelletet 1 ml ivóvízben kell visszaoldani, majd annyi ivóvízben, amennyit az állatok 1-2 órán belül elfognak fogyasztani. Az állományt az immunizálás előtt ajánlatos 2 órán keresztül szomjaztatni.

## 10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Pulyka (ehető szövetek): Nulla nap.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

+2°C - +8°C között, fénytől védve tárolandó.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

## 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

**A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések**


Csak egészséges állatok vakcinázhatók.

Amennyiben lehetséges, aszeptikus módon kell alkalmazni.

A vakcina oldat készítéséhez csak steril, fertőtlenítőszer mentes eszközök használhatók.

A vakcinázást megelőzően és az azt követő napokban az állatokat stresszhatásoktól óvni kell (szállítás, csörkurtítás).

Csak akkor érdemes vakcinázni, ha a szikellenanyagok már kiürültek.



**Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések**

Az általános munkavédelmi előírások betartása szükséges. Ha a készítmény a bőrre vagy szembe kerül, alapos vizes öblítés szükséges. Vakcinázás után kezünket és a felszerelést fertőtlenítsük.

**Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók**

Nem áll rendelkezésre információ a vakcina más állatgyógyászati készítménnyel történő egyidejű alkalmazásának hatékonyságára és ártalmatlanságra vonatkozóan. A vakcina használata előtt vagy után más állatgyógyászati készítmény alkalmazását az eset megítélésétől függően szükséges eldönteni.

**Inkompatibilitások**

A víznek, valamint a vakcina elkészítéséhez és szétosztásához használt berendezéseknek fertőtlenítőszerrel és antiszeptikumokkal mentesnek kell lennie. Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

**14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA**

2010. szeptember 20.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Felhasználhatósági időtartam: 24 hónap.

Kiszerezés: 1000 adagos üveg, 10x1000 adagos üveg, dobozban.

Tk. szám: 2776/1/10 MgSzH-ÁTI (1000 adag)

Vényköteles. Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez: Rhone Vet Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

