

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Nemovac

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, NEVE ÉS CÍME, A KÉPVISELŐ NEVE TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Merial 29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország. Képviselő: Rhone Vet Kft.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation 69800 Saint Priest, Franciaország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Nemovac vakcina A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 adag vakcina tartalmaz:

SHS vírus (PL 21 törzs) min.

10^{2,3} CCID₅₀

segédanyag

1 adagnak megfelelő mennyiségben.

4. TERÁPIÁS JAVALLAT(OK)

Csirkék "duzzadtfej" szindrómája (Swollen head syndrome) elleni élő, attenuált vakcina.

Húscsirkék olyan légzőszervi betegségeinek megelőzésére, amelyben a SHS vírusa is szerepet játszik.

5. ELLENJAVALLATOK

Nincsenek.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nincsenek.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Házityúk.

8. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT, ALKALMAZÁS HELYE ÉS MÓDJA

Itatásos vakcinázásra.

Közvetlenül a fertőtlenítőszerből mentes vízben történt feloldás után kell felhasználni.

Amennyiben a vakcina beadása csapvízben történik, a kiengedett csapvizet egy éjszakán át állni kell hagyni, vagy 2,5 g/l sovány tejjel kell a vakcinára káros klórtartalmát semlegesíteni.

A vakcinát tiszta (antiszeptikum- és fertőtlenítőszermentes) csapvízben kell feloldani (1 ml), majd tovább hígítani az állatok életkorának megfelelően úgy, hogy az állatok a feloldástól számított két órán belül bizonyosan felvegyék. Ajánlatos az állományt az immunizálás előtt kb. két órán keresztül szomjaztatni.

9. HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁS, ha szükséges

Vakcinázási program:

Húscsirkék: egyszeri itatásos immunizálás 7-14 napos életkor között

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nulla nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől elzárva tartandó!

+2 °C és +8 °C között, fénytől védve tárolandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Csak egészséges állatok vakcinázhatók.

Az általános higiéniai követelményeket be kell tartani.

A vakcinázás előtt 24 órával az ivóvíz bármilyen kezelését, fertőtlenítését be kell szüntetni.

A vakcina itatásos immunizálása során elegendő mennyiségű és tiszta itató edény szükséges, hogy a madarak megfelelő mennyiségű vakcinát vehessenek fel.

Feloldás és hígítás után a vakcinát azonnal fel kell használni, a vakcinát olyan mennyiségű vízben kell hígítani, amelyet a madarak 2 órán belül biztosan elfogyasztanak. (Általában annyi ml vízben, ahány napos korú az állat.)

A szokásos ivóvíz-itatást addig nem lehet újra kezdeni, amíg a vakcina tartalmú víz el nem fogyott.

A vakcina oldat előkészítéséhez csak steril, antiszeptikum- és fertőtlenítőszer-mentes eszközöket lehet használni.

Vakcinázás után fertőtlenítőszeres kézmosás szükséges.

Az általános munkavédelmi szabályokat be kell tartani.



13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY ÉS A KÉSZÍTMÉNYBŐL KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat forralással, égetéssel vagy a helyi hatóságok által engedélyezett fertőtlenítőszerbe történő merítéssel, kell megsemmisíteni.

14. LEJÁRATI IDŐ

18 hónap. Csak a csomagoláson feltüntetett lejáratidőn belül szabad felhasználni!

15. RENDELHETŐSÉG, FORGALMAZHATÓSÁG

Vényköteles.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez: Rhone Vet Kft. 2053 Herceghalom, Petőfi u. 9.

16. KISZERELÉSI EGYSÉGEK, és ha a forgalomba hozatali engedélybe fel van tüntetve, BONTHATÓSÁG

1000, 10x1000, 5000, 10x5000 adag.

17. TÖRZSKÖNYVI SZÁM

2547/1/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)

2547/2/09 MgSzH ÁTI (5000 adag)

18. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2009. június 25.

