

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
Palmivax vakcina

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, NEVE ÉS CÍME, A KÉPVISELŐ NEVE TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Merial 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: Merial Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Avation 69800 Saint Priest, Franciaország

**2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**

Palmivax vakcina A.U.V.

**3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE**

A Palmipede hígítóban feloldott vakcina adagja (0,5 ml) tartalmaz:

Derzsy-betegség vírusa, Hoekstra törzs, legalább	10 <sup>2,5</sup> CCID <sub>50</sub>
Kazein hidrolizátum, legfeljebb	3 mg
Kanamycin, legfeljebb	0,75 mg
Pimaricin, legfeljebb	0,0055 mg

**4. TERÁPIÁS JAVALLAT(OK)**

Ludak és barbarie-kacsák immunizálása Derzsy-betegség (libaparvovirozis) ellen.

**5. ELLENJAVALLATOK**

A vedlés időszakában és tolttépés ideje alatt a tenyészállatok nem vakcinázhatók

**6. MELLÉKHATÁSOK**

Nincsenek.

**7. CÉLÁLLAT FAJOK**

Lúd és barbarie-kacsa

**8. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT, ALKALMAZÁS HELYE ÉS MÓDJA**

0,5 ml/állat, bőr alá vagy izomba oltva

A liofilezett vakcinát a Palmipede hígítóval történő feloldás után azonnal fel kell használni, az alábbi vakcinázási program szerint.

**9. HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁS, ha szükséges**

Alapimmunizálás:

1. Vakcinázott szülők utódai:

Az alapimmunizálás nem hatékony, ha az állatokban szülői eredetű ellenanyag perzisztál.

Libák, kacsák alapimmunizálása: az állatok szerológiai állapotától függően 3-4 hetes életkortól.

2. Nem vakcinázott szülők utódai:

A napos állatokat fogadásakor gyakorta Derzsy-betegség elleni hiperimmun szérummal kezelik. Az alapimmunizálást ilyen esetben a szérum kiürülését követően kell elvégezni.

Szérummal nem kezelt, szeronegatív állatok alapimmunizálása szükség esetén – a járványhelyzettől függően – a harmadik hetes életkor betöltése előtt kivételesen megkezdhető.

Tenyészállatok felnőtt korban:

Az alapimmunizálás elvégzése után egy emlékeztető oltás elegendő a tenyész-szezon megkezdése előtt 1-2 héttel. Ha az állatok előzőleg nem részesültek alapimmunizálásban, a tojószezon megkezdése előtt két alkalommal, 3 hetes időközzel, úgy célszerű vakcinázni, hogy a második oltás a tojásrakás várható megkezdése előtt 2 héttel történjen.

**10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nulla nap

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

**Gyermekek elől elzárva tartandó!**

A vakcina +2 °C és +8 °C között, fénytől védve tárolandó. A hígító +2 °C és +25 °C között tárolandó, nem fagyasztható.



**12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**

Csak egészséges állatok vakcinázhatók.

Az általános aszeptikus körülményeket biztosítani kell.

Az oltás céljára steril, fertőtlenítőszer mentes eszközök használhatók.

Nem keverhető más vakcinával vagy immunológiai készítménnyel.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY ÉS A KÉSZÍTMÉNYBŐL KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat forralással, égetéssel vagy a hatóság által előírt fertőtlenítőszerbe való merítéssel kell megsemmisíteni.

**14. LEJÁRATI IDŐ**

24 hónap (vakcina).

24 hónap (hígító).

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A Palmipede hígítóban történő feloldás után a vakcinát azonnal fel kell használni.

**15. RENDELHETŐSÉG, FORGALMAZHATÓSÁG**

Vényköteles. Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra. Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják. Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez: Rhone Vet Kft. 2053 Herceghalom, Petőfi u. 9.

**16. KISZERELÉSI EGYSÉGEK, és ha a forgalomba hozatali engedélybe fel van tüntetve, BONTATHÓSÁG**

Vakcina: 500 adag üvegben, dobozban.

Palmipede hígító: 500 adag (250 ml) üvegben vagy polipropilén palackban, dobozban.

**17. TÖRZSKÖNYVI SZÁM**

2580/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag)

**18. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2011. március 19.

