

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TS 11 vakcina

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

MERIAL 29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

MERIAL Italia S.P.A., Via Baviera 9, ZI Camin 35027 Noventa Padovana, Olaszország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

TS 11 vakcina A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

A vakcina adagonként (0,03 ml) tartalmaz:

- Mycoplasma gallisepticum*, TS-11 törzs legalább $10^{7,9}$ CCU (színváltoztató egység)
- amoxicillin 200 mg/ml
- Vivószer q.s. 1 adag

4. JAVALLAT(OK)

A vakcina kilenc hetes vagy annál idősebb, egészséges húshibrid szülőpárok és tojóállományok immunizálására szolgál a *M. gallisepticum* fertőzés kártételeinek csökkentésére. A vakcinázás hatására a *M. gallisepticum* okozta légzőszervi tünetek csökkennek, és mérséklődik a tojástermelés-csökkenés.

A vakcinázás szerológiai választ vált ki, ezért olyan tenyészállományok esetében, ahol követelmény a szeronegativitás, a vakcina használata ellenjavallt.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem vakcinázhatók olyan tenészcímek, amelyeknél *M. gallisepticum* szeronegativitást írnak elő.

A *M. gallisepticum* pozitív, vagy mycoplasmosisban beteg madarak vakcinázása ellenjavallt.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismeretesek.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Házityúk (húshibrid szülőpárok és tojóállományok).

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

A vakcina adagja 0,03 ml. Szembecseppentés.

9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

1. A palackokat amilyen gyorsan csak lehet, +30 °C-nál nem melegebb vízben fürdetve kell felolvasztani. A kupak eltávolítása előtt jól fel kell rázni.
2. Távolítsuk el a zárat és a kupakot, majd helyezzük be a csöppentőt. A vakcinát felbontás után azonnal fel kell használni.
3. Minden madarat úgy kell tartani, hogy fejének egyik oldala fölfelé nézzen.
4. **Cseppentsünk egy cseppet a szembe, várjuk meg a vakcina szétterjedését, és csak utána engedjük el a madarat.**
5. A felolvasztott palack teljes tartalmát fel kell használni.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Házityúk (ehető szövetek): 21 nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

-70 °C-on, vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten. Visszafagyasztani tilos.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejáratú időn belül szabad felhasználni!

Lejáratú idő: 24 hónap. Felolvasztás után a vakcina azonnal felhasználandó!

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Más baromfiállományok nem immunizálhatók.

Meg kell akadályozni a vakcinatörzs más baromfiállományokba való bekerülését.

Egy telepen kizárólag a vakcinával immunizált állatok tarthatók.



Különleges figyelmeztetések az állatokon való alkalmazáshoz

Szükséges, hogy a vakcinázott csirkék megfelelő környezetben legyenek.

A vakcina törzs átterjedhet a vakcinázott madarokról más madarakra, ennek a lehetőségét a minimálisra kell csökkenteni.

Csak egészséges állatok vakcinázhatók.

A vakcinázást legalább három héttel a feltételezett fertőződés előtt kell elvégezni.

Egy légtérben valamennyi madarat egyszerre kell vakcinázni, és minden madárnak egy adagot kell beadni.

A vakcinázás folyamán és utána a stresszhatásokat kerülni kell.

Ne telepítsük a csirkéket fertőzött környezetbe.

A vakcinázás előtt 14 nappal és utána 7 nappal az állományban ne végezzünk gyógykezelést antibiotikumot tartalmazó készítményekkel.

Állatorvosi felügyelet mellett alkalmazható.

A használati utasítást figyelmesen kell elolvasni, és maradéktalanul be kell tartani.

A vakcinázás az állományban esetleg tömegesen jelenlévő, virulens, vad törzs vertikális terjedését nem akadályozza meg.

A vakcina használatának vonatkozásában mindenkor az Állategészségügyi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

Tojástermelés alatt nem alkalmazható.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

Élő baktériumot tartalmazó vakcina.

Ha a készítmény bőrre kerül, alapos vizes öblítés szükséges.

Ha a vakcina szembe vagy szájba kerül, a készítmény használati utasításával együtt azonnal forduljunk orvoshoz.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat forralással, égetéssel vagy a hatóság által előírt fertőtlenítőszerbe való merítéssel kell megsemmisíteni.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2010. június 2.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Vényköteles. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Kiszerezés:

1000 adag (30 ml műanyag palack).

10x1000 adag (10x30 ml műanyag palack műanyag dobozban).

Törzskönyvi szám: 2434/1/08 MgSzH ÁTI (1000 adag)

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez: Rhone Vet Kft., 2053 Herceghalom, Petőfi u. 9.

